

Quadro 1. Vacinas do Calendário da Criança e esquemas até os sete anos de idade.

VACINAS	DOSES DA VACINA E IDADE RECOMENDADA NO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO		ORIENTAÇÕES PARA PARA ATUALIZAÇÃO DO CARTÃO/CADERNETA DE VACINAÇÃO VACINAÇÃO DE CRIANÇAS COM ESQUEMA VACINAL INCOMPLETO OU NÃO VACINADA
	ESQUEMA DE VACINAÇÃO	IDADE	
BCG	Dose única	Ao nascer	Criança não vacinada, administrar uma dose da vacina até quatro anos, 11 meses e 29 dias
Hepatite B	Dose ao nascer	Ao nascer	Criança não vacinada ao nascer, administrar uma dose da vacina hepatite B até um mês de idade
Penta	3 doses	1ª dose: 2 meses 2ª dose: 4 meses 3ª dose: 6 meses	Criança de dois meses até seis anos, 11 meses e 29 dias - Iniciar / complementar / concluir o esquema básico
Polio inativada	3 doses	1ª dose: 2 meses 2ª dose: 4 meses 3ª dose: 6 meses	Criança a partir de dois meses a menor de cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias) - Iniciar / complementar / concluir o esquema básico
Polio oral	2 reforços	1º reforço: 15 meses 2º reforço: 4 anos	Criança a partir dos 15 meses a menor de cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias) - Iniciar / complementar / concluir o esquema de vacinação
Rotavírus	2 doses	1ª dose: 2 meses 2ª dose: 4 meses	Criança com idade de um mês e 15 dias a três meses e 15 dias poderá receber a 1ª dose Criança com idade de três meses e 15 dias até sete meses e 29 dias poderá receber a 2ª dose desta vacina
Pneumocócica 10-valente	2 doses 1 reforço	1ª dose: 2 meses 2ª dose: 4 meses Reforço: 12 meses	Vacina pode ser administrada em criança a partir dos dois meses até os quatro anos de idade (quatro anos 11 meses e 29 dias).
			Crianças que iniciaram o esquema primário após 4 (quatro) meses de idade, devem completá-lo até 12 meses, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses; administrar o reforço com intervalo mínimo de 60 dias após a última dose (O reforço deve ser administrado entre 12 meses e 4 (quatro) anos, 11 meses e 29 dias)
			Criança entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade com esquema completo de 2 (duas) ou 3 (três) doses, mas sem a dose de reforço, administrar o reforço
			Crianças sem comprovação vacinal, entre 12 meses e 4 (quatro) anos 11 meses e 29 dias, administrar dose única
			Para as crianças de 2 (dois) meses a menores de 5 (cinco) anos de idade, com indicação clínica especial manter

			esquema de 3 (três) doses e reforço, conforme as indicações do CRIE
Meningocócica C	2 doses 1º reforço	1ª dose: 3 meses 2ª dose: 5 meses 1º Reforço: 12 meses	Vacina pode ser administrada em criança a partir dos três meses de idade até os quatro anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias).
			Criança que iniciou o esquema após cinco meses de idade deve completá-lo até 12 meses, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses; administrar o reforço com intervalo mínimo de 60 dias após a última dose
			Criança entre um a quatro anos de idade com esquema básico de duas doses, mas sem a dose de reforço, administrar o reforço
			Criança entre um e quatro anos de idade, sem comprovação vacinal, administrar uma única dose
Febre amarela	1 dose Reforço	Dose: 9 meses Reforço: 4 anos	Crianças entre nove meses e quatro anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias): Administrar 1 (uma) dose e dose de reforço aos quatro anos de idade.
			Crianças entre cinco e seis anos de idade, não vacinada ou sem comprovante de vacinação: Administrar 1 (uma) dose única.
			Crianças entre cinco e seis anos de idade que receberam uma dose da vacina antes de completarem 5 anos de idade: Administrar uma dose de reforço. Respeitar intervalo mínimo de 30 dias, entre a dose e o reforço.
			ATENÇÃO: Esta vacina está contraindicada para crianças menores de seis meses!
Tríplice viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola)	2 doses (1ª dose com SCR e 2ª dose com SCRv)	12 meses	Criança de 12 meses até seis anos, 11 meses e 29 dias deverá receber a 1ª dose da tríplice viral e agendar a 2ª dose da vacina tetra viral ou tríplice viral mais varicela (atenuada), conforme a disponibilidade da vacina, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses
Tetra viral (SCRv - sarampo, caxumba e rubéola e varicela)	1 dose (corresponde a segunda dose da SCR e primeira de varicela)	15 meses	A vacina tetra viral está disponível na rotina de vacinação para crianças com idade entre 15 meses e 4 anos 11 meses e 29 dias
			Criança a partir de cinco anos de idade não vacinada ou sem comprovante de vacinação deverá receber a 1ª dose da tríplice viral e agendar a 2ª dose da tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses
DTP	2 reforços	1º reforço: 15 meses 2º reforço: 4 anos	Criança até os 4 (quatro) anos de idade. Administrar o primeiro reforço com intervalo mínimo de 6 (seis) meses após a 3ª dose do esquema básico; intervalo mínimo de 6 (seis) meses entre os reforços
			Criança de 15 meses até seis anos, 11 meses e 29 dias sem nenhum reforço, administrar o 1º reforço e agendar o segundo reforço. Atentar para o intervalo de 6 meses entre as doses
			Crianças com 6 anos sem nenhuma dose de reforço administrar o 1º reforço. Na impossibilidade de manter o intervalo de 6 meses entre as doses de reforço, agendar dT

			para 10 anos após esse primeiro reforço. Neste caso estas crianças ficam liberadas do segundo reforço
Hepatite A	1 dose	15 meses	Criança a partir de 15 meses até quatro anos 11 meses e 29 dias deverá receber uma dose
Varicela	1 dose	4 anos	Crianças de 4 anos até 6 anos, 11 meses e 29 dias deverá receber uma dose de varicela. Corresponde à segunda dose da vacina varicela, considerando a dose de tetra viral ou tríplice viral mais varicela aos 15 meses

ATENÇÃO: Crianças que se encontrarem em situações ou condições clínicas especiais deverão ser avaliadas e vacinadas se houver indicação pelo Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE).

Vacinação Simultânea: A vacina febre amarela não deve ser administrada simultaneamente com a vacina tríplice viral ou tetra viral em crianças menores de 2 (dois) anos de idade.

O intervalo entre estas deverá ser de 30 dias (mínimo 15 dias).

Para a criança que recebeu anteriormente as vacinas tríplice viral e febre amarela, não há evidências de interferência na imunogenicidade entre elas, as duas poderão ser administradas simultaneamente ou sem intervalo mínimo entre as doses. Se a criança recebeu apenas uma das vacinas (tríplice viral ou febre amarela), estabelecer preferivelmente o intervalo de 30 dias entre as doses (mínimo 15 dias).

Quadro 2. Vacinas do Calendário da Criança a partir dos sete anos de idade e do Calendário do Adolescente.

VACINAS	DOSES DA VACINA E IDADE RECOMENDADA NO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO		ORIENTAÇÕES PARA PARA ATUALIZAÇÃO DO CARTÃO/CADERNETA DE VACINAÇÃO VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ESQUEMA VACINAL INCOMPLETO OU NÃO VACINADA
	ESQUEMA DE VACINAÇÃO	IDADE	
Hepatite B	Iniciar ou completar 3 doses, de acordo com histórico vacinal	-	Criança e adolescente não vacinada com a vacina hepatite B ou com a penta; e adolescente sem comprovação vacinal deverá receber três doses da vacina hepatite B com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose e de seis meses entre a primeira e a terceira dose (zero, um e seis meses)
			Criança e adolescente com esquema vacinal incompleto: não necessita reiniciar o esquema, apenas completá-lo conforme situação encontrada
			Gestante adolescente não vacinada ou com esquema incompleto deve ser vacinada com a vacina hepatite B de acordo com a situação vacinal, iniciando, continuando, ou completando o esquema. A vacina pode ser administrada a partir da comprovação da gravidez, em qualquer idade gestacional
Febre amarela	Dose única	-	Crianças ou adolescentes a partir de sete anos de idade, não vacinadas ou sem comprovante de vacinação: Administrar 1 (uma) dose única
			Crianças ou adolescentes a partir de sete anos de idade, que receberam uma dose da vacina antes de completarem 5 anos de idade: Administrar uma dose de reforço. Respeitar intervalo mínimo de 30 dias, entre a dose e o reforço
			Atenção: Esta vacina é contraindicada para gestantes e Nutrizes que estejam amamentando crianças menores de 6 (seis) meses de vida
Tríplice viral	Iniciar ou completar 2 doses, de acordo com histórico vacinal	-	Criança ou adolescente não vacinado ou com esquema incompleto, deve ser vacinado com a vacina tríplice viral conforme situação encontrada, considerando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses
			Atenção: Esta vacina é contraindicada para gestantes
Difteria e tétano adulto	Iniciar ou completar 3 doses, de acordo com histórico vacina Reforço a cada 10 anos	-	Criança a partir de sete anos de idade ou adolescente não vacinado ou sem comprovação vacinal para difteria e tétano, administrar três doses com intervalo de 60 dias entre elas, mínimo de 30 dias
			Criança ou adolescente com esquema vacinal incompleto para difteria e tétano, deve ser vacinada continuando ou completando o esquema de três doses, considerando as doses anteriores, com intervalo de 60 dias entre elas, mínimo de 30 dias

			Na gestante sem história prévia de vacinação administrar a vacina a partir da comprovação da gravidez, em qualquer período gestacional. Completar o esquema vacinal, preferencialmente até 20 dias antes da data provável do parto
Meningocócica ACWY	1 dose	11 e 12 anos	Adolescentes de 11 e 12 anos de idade, não vacinado ou sem comprovante de vacinação: administrar 1(um) reforço ou dose única de acordo com a situação vacinal encontrada.
			A vacina meningocócica ACWY (conjugada) não está indicada para gestantes e para aquelas que estiverem amamentando. No entanto, diante do risco de contrair a doença, a relação risco benefício deve ser avaliada.
HPV quadrivalente	2 doses	Meninas: de 09 a 14 anos Meninos: de 11 a 14 anos	Meninos e meninas que receberam a primeira dose e não completaram o esquema vacinal, mesmo após o período de seis meses, devem receber a segunda dose
			Se o adolescente recebeu a primeira dose da vacina aos 14 anos de idade, a segunda dose deverá ser administrada com um intervalo mínimo de seis meses. Não há intervalo máximo recomendado entre as doses, no entanto um intervalo não superior a 12-15 meses é sugerido para completar o cronograma prontamente
			Não administrar primeira dose para adolescentes maiores de 14 anos, 11 meses e 29 dias (15 anos). Para adolescentes de 15 anos, só deverá ser completado esquema vacinal (segunda dose)
			Meninas que já completaram o esquema vacinal com a vacina bivalente não devem ser revacinadas
			Atenção: Esta vacina está contraindicada para gestantes.
Varicela	1 ou duas doses	A partir dos 7 anos	Criança ou adolescente <u>indígena</u> a partir dos sete anos de idade não vacinado ou sem comprovação vacinal deve receber uma dose ou duas doses de vacina varicela (atenuada) a depender do laboratório produtor.
			Atenção: Esta vacina é contraindicada para gestantes.
dTpa	1 dose	-	Considerar que independente do histórico de vacinação com dT, a gestante deve receber uma dose de dTpa em cada gestação.
			Para aquelas que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante a gestação, administrar uma dose de dTpa no puerpério, o mais precocemente possível.

ATENÇÃO: Crianças que se encontrarem em situações ou condições clínicas especiais deverão ser avaliadas e vacinadas se houver indicação, pelo Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE). Para informações sobre precauções, contraindicações e outras particularidades, acessar a Instrução Normativa do Calendário Nacional de Vacinação.